



LPI požymiai



Gonoreėja



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Aušros g. 42 A Kaunas

Tel. (8 37) 45 47 17

Faks. (8 37) 33 32 04

El. paštas info@kaunovsb.lt

www.kaunovsb.lt

LR sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis

Kaip išvengti
LPI?

Chlamidiozė

Sifilis





LPI – tai infekcijos, sukeltos bakterijų ar virusų ir perduodamos vieno asmens kitam lytinių kontaktų metu. Lytiniai kontaktai – tai ne vien lytiniai santykiai, bet ir bučiniai, oraliniai, analiniai santykiai, taip pat sekso reikmenų naudojimas. Kai kurios LPI gali plisti kontakto su oda metu ar būti perduodamos iš motinos kūdikiui gimdymo ar žindymo krūtimi metu.

Dažnai LPI užsikrėtę asmenys nejaučia jokių simptomų. Pasi- taiko atvejų, kai užsikrėtęs asmuo pastebi simptomus, kurie greitai pra- nyksta arba kai LPI požymiai pasireiškia po keleto savaitių, mėnesių ar net metų.

Dažniausiai pasireiškiantys LPI požymiai: niežėji- mas ar bėrimas, paraudimas, skausmas lytinių orga- nų srityje, skausmas šlapinantis, neskaidrus, stipraus kvapo šlapimas, žaizdelės ar pūslelės ant lytinių organų arba aplink juos, prie išangės ar burno- je, spazmai, maudimas pilvo srityje, genitali- jų karpos, kraujo pasirodymas po lytinių santykių, išskyros iš šlapimo ar lytinių organų.

ŽIV/AIDS

ŽIV – žmogaus imunodeficitą virusas, naikantis žmogaus imuniteto ląsteles, saugančias organizmą nuo bakterijų, virusų, gry- belių, pirmuonių. Paskutinė ŽIV infekcijos stadija vadinama AIDS – įgytu imunodeficitu sindromu. Liga būna be simptomų ir plinta lytinių santykiu metu, per kraują, ŽIV infekuota motina gali užkrėsti savo vaiką gimdymo ar žindymo krūtimi metu. Ši liga išlieka visam gyvenimui, tačiau laiku pradėjus gydymą tampa beveik neužkrečiama lytinių santy- kių metu, o gyvenimo trukmė beveik nepakinta.



100 % veiksmingas būdas apsisaugoti nuo LPI yra visiškas susilaikymas nuo lytinių santykių. Ištikimybe pagrįsti santykiai su vienu par- tneriu taip pat laikomi saugiais. Kitas būdas apsisau- goti nuo LPI – prezervatyvų naudojimas. Taip pat verta reguliariai apsilankyti pas bendrosios praktikos gydytoją, dermatologą, venerologą, ginekologą ar urologą, atlikti laboratorinius tyrimus.


Bakterijų sukeltą LPI galima išgydyti vaistais (antibiotikais ir kitais antimikrobiniais prepa- ratais). Nenustatytos ir laiku negydamos LPI gali sukelti nevaisingumą, persilei- dimą, infekcijos gali būti perduoda- mos vaikui.

Chlamidiozė

yra dažnai pasitai- kanti infekcija, kurią sukelia bakterija. Ja užsikrėtus dažnai nebū- na jokių simptomų. Jeigu jie pasireiškia, dažniausiai jaučia- mas skausmas pilvo srityje, atsiranda deginantis pojūtis šlapinantis. Negydoma liga gali sukelti šlapimtakio, gimdos kakle- lio, išsėjos angos gleivinių, akių junginės uždegimus, nevaisingumą, pažeisti sąnarius.

Gonorėja

sukelia bakterija, gyve- nanti lyties organų, akių, gerklės, išsėjos angos gleivinėje. Simptomai pasireiš- kia praėjus 3-5 dienoms po infekcijos patekimo į organizmą. Dažniausiai atsiranda pūlingų išskyrų ir skausmas šlapinantis, kartais nepas- tebimi jokie ligos simptomai. Laiku nediagnozuota ir negydoma liga progresuoja ir gali su- kelti nevaisingumą.



Sifilis

yra rimta, tačiau pirminiuose ligos vystymosi eta- puose antibiotikais pagydoma liga. Liga pasireiškia bėrimais lyties orga- nuose, plaukuotoje galvos dalyje, burnos gleivinėje. Negydoma infekcija sukelia skaus- mus sąnariuose, plaukų slinkimą bei kepenų uždegimą. Vėliau sifilis paveikia nervų sistemą, širdį bei kaulus, paskutinėje ligos stadijoje žmogus su- serga psichine liga arba paralyžiumi. Šia liga gali būti užkrečiamas infekuotos motinos vaisius.

